

Link do produktu: <https://akwamaniak.pl/kent-rxp-srodek-leczniczy-przeciw-pasozytom-500-ml-p-6133.html>



KENT Rx.P - Środek leczniczy przeciw pasożytom 500 ml

Cena	110,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KENT Rx.P - Środek leczniczy prz
Producent	Kent

Opis produktu

KENT Rx.P - Środek leczniczy przeciw pasożytom 500 ml

Przełom w leczeniu pasożytów u ryb morskich!

- Potrójnie działający środek przeciw ichtiofirozie ryb morskich oraz innym chorobom pasożytniczym;
- Nie zawiera mieszaniny cukru i octu winnego, powodującego przejście kulorzęska (*Ichthyophthirius multifiliis*) w formę przetrwalną;
- W przeciwieństwie do sosu pieprzowego RxP pozwala na zwalczanie pasożytów w każdym stadium rozwoju;™
- Preparat o lekkiej, płynnej konsystencji. Nie jest zawieszysty, nie zanieczyszcza wody w akwarium;
- Bardzo skuteczny, działa lepiej niż związki miedzi, nie pozostawiając szkodliwych jonów metali;
- Zawiera tylko naturalne składniki;
- Można stosować w akwarium z obsadą bezkręgową (przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności). Konieczny jest wydajny system filtracji biologicznej, np. złoża zraszane i dobrze wyregulowany odpieniacz. (Uwaga - pasożyty także należą do bezkręgowców. Proszę uważnie przeczytać sposób użycia);
- Nie zawiera miedzi i rakotwórczych barwników;
- Nadaje się do stosowania w akwariach z rekinami, rajami i rybami bezłuskimi;
- W przeciwieństwie do leków opartych na jonach metali nie wywołuje choroby linii bocznej;
- Butelka o pojemności 8 fl oz (236,6ml) wystarczy na 13-dniową kurację w akwarium o pojemności około 190 litrów.

KENT Marine RxP to potrójnie działający środek przeciw kulorzęskowi atakującemu ryby morskie. Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, nadaje się do stosowania w akwarium z obsadą mieszaną (ryby - bezkręgowce). Nie używać w akwariach ze skrzydlicami, szkaradnicami, skorpenami, rozgwiazdami, jeżowcami, strzykwami (morskimi jabłkami, morskimi ogórkami), ślimakami nągoskrzelnymi.

Sposób użycia:

Ważne: konieczna codzienna regulacja odpieniacza! Z systemu filtracji usunąć węgiel aktywowany. Za pomocą preparatu Superbuffer-dKH doprowadzić twardość wody do 8 dKH lub wyżej. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką! Podawać dwie łyżeczki od herbaty (10ml) na każde 95 litrów pojemności akwarium, co drugi dzień. Leczenie prowadzić przynajmniej przez 13 dni (7 dawek preparatu). Zachować opisane niżej środki ostrożności! Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty leczenia, w dni, kiedy preparat nie jest podawany, stosować PolyOx, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po zakończeniu leczenia przeprowadzić podmianę wody (>20%) i zastosować węgiel aktywowany, w celu usunięcia pozostałości leku. Jako środek zapobiegawczy przy wprowadzaniu nowych ryb, przeprowadzać 3 cykle leczenia.

Ważne! W akwariach rafowych w celu wzmocnienia koralowców stosować suplementację wapniem jednocześnie podając KENT Coral-Vite™ oraz KENT Tech.I.

Jako kąpiel: przygotować roztwór, wlewając nakrętkę płynu do 4 litrów wody morskiej. Czas kąpieli - maksymalnie 15 minut.

Obserwować zachowanie ryby. W przypadku wystąpienia objawów stresu (gwałtowne ruchy pokryw skrzelowych lub inne) natychmiast wyłowić zwierzę.

Środki ostrożności: Uwaga: Użycie RxP w zbiorniku bez sprawnie działającej filtracji biologicznej i odpieniacza może być niebezpieczne dla hodowanych bezkręgowców, a nawet zagrozić rybom! (Polecana metoda filtracji biologicznej - złożo zraszane z bio-balli. Inne rodzaje filtracji: podżwirowa, metoda Jauberta i berlińska mogą być zbyt mało wydajne). Odpieniacz powinien być regulowany codziennie, aby zapewnić jak najlepsze zbieranie zanieczyszczeń. Słaba filtracja może doprowadzić do wzrostu poziomu amoniaku i azotynów. Ze względu na wysoką odporność słonowodnych pasożytów preparat RxP ma niezwykle silne działanie, co wymaga od użytkownika zachowania szczególnych środków ostrożności. Konieczna jest codzienna obserwacja zwierząt w akwarium.

Akwaria z obsadą mieszaną: RxP nie nadaje się do akwariów z skrzydlicami, szkaradnicami i skorpenami. Aby kuracja przyniosła pożądany skutek i doprowadziła do wyleczenia, ryba poddawana leczeniu musi być w dobrej kondycji ogólnej. Dlatego należy rozpocząć podawanie leku w momencie zauważenia pierwszych oznak pojawiania się pasożyta lub w przypadku wystąpienia niepokojących objawów (np. nietypowe plamy na ciele ryby). Zaleca się profilaktyczne zakupienie preparatu, aby w razie potrzeby mieć go w zapasie. Maksymalne stężenie leku następuje bezpośrednio po jego podaniu, a potem gwałtownie opada, dzięki pracy odpowiednio wyregulowanego odpieniacza. Zmętnienie wody, utrata barw przez ryby lub pojawienie się na ich ciele plam, nadmierne wydzielanie śluzu przez koralowce, szczelne zamknięcie polipów oraz nie otwieranie ich przez kilka godzin po podaniu preparatu, może świadczyć o jego przedawkowaniu bądź mało wydajnym działaniu odpieniacza lub filtra biologicznego. W takim przypadku należy przerwać podawanie RxP, zastosować węgiel aktywowany, przeprowadzić podmianę wody lub przenieść zarażone zwierzęta do innego zbiornika. Sposób postępowania zależy od warunków panujących w akwarium, reakcji znajdujących się w nim organizmów oraz możliwości akwarysty. Stosowanie RxP wymaga kontrolowania warunków panujących w zbiorniku.

Akwaria rafowe: Produkt może być używany w akwariach rafowych wyłącznie przez doświadczonych hobbystów, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Ponieważ RxP ma za zadanie zwalczanie morskich pasożytów, które także są bezkręgowcami, stosowanie go może wpłynąć negatywnie również na organizmy bezkręgowce, których obecność jest pożądana. Pracownicy firmy Kent Marine korzystają z preparatu, ponieważ wiedzą, jak radzić sobie w przypadku pojawienia się problemów i na co zwracać uwagę. Jeśli w zbiorniku znajdują się cenne koralowce twarde oraz koralowce z rodzaju Discosoma, warto przed zastosowaniem preparatu przenieść je do innego akwarium. Doświadczeni hobbysci mogą podjąć ryzyko leczenia, szczególnie jeśli prowadzą regularną obserwację obsady. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie preparatu w akwariach z obsadą bezkręgową. Przeniesienie twardych koralowców nie oznacza, że trzeba także usuwać żywą skałę, miękkie koralie i glony wapienne, co pozwala zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku. Stwierdzono, że większość koralii miękkich, gorgonie oraz koralie z rodzaju Clavularia nie reaguje na obecność substancji zawartych w preparacie. Nie stosować w akwariach ze skrzydlicami, szkaradnicami, skorpenami, rozgwiazdami, jeżowcami, strzykwami (morskimi jabłkami,orskimi ogórkami), ślimakami nagooskrzelnymi.

Niektóre bezkręgowce morskie mogą reagować na obecność RxP zamykaniem się, wydzielaniem większej ilości śluzu lub na inne sposoby. Objawy te mają charakter przejściowy i nie oznaczają zagrożenia dla życia zwierzęcia, jednak w ocenie sytuacji warto polegać na własnym doświadczeniu. Zastosowanie węgla aktywowanego lub regulacja odpieniacza mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej przenieść zwierzęta do innego zbiornika. Powinny szybko powrócić do normalnego stanu. Najbardziej wrażliwe na substancje zawarte w preparacie są koralowce twarde i koralowce z rodzaju Discosoma, dlatego należy je uważnie obserwować. Reakcje zależą od kondycji zwierzęcia i warunków panujących w akwarium, warto jednak zwrócić szczególną uwagę na ciasno zamknięte polipy. Wyglądają one tak, jakby ich tkanka zewnętrzna stała się niezwykle cienka. Mogą prześwitywać przez nią elementy szkieletu wewnętrznego. Przedstawiciele Discosoma sp. reagują często wyrzuceniem na zewnątrz zawartości jamy chłonnotrąwającej, stają się śliskie, wyglądają jakby zaczęły się "rozpuszczać". W takiej sytuacji należy je bezwzględnie usunąć ze zbiornika. Nie zaleca się używania preparatu w akwariach, w których znajdują się koralowce z rodzaju Acropora lub inne twarde o drobnych polipach, ponieważ trudno jest u nich zauważyć niepokojące zmiany. Zbyt długie podawanie preparatu, dawkowanie niezgodnie z instrukcją, przy mało wydajnym systemie filtracji biologicznej i odpieniaczu może doprowadzić do uszkodzenia lub śmierci posiadanych zwierząt.

Zawartość: Woda dejonizowana, naturalne wyciągi z roślin, pieprz, stabilizowana witamina C, stabilizatory.

Uwaga: Preparat zawiera pieprz, może podrażniać oczy i błony śluzowe! Wskazane użycie okularów ochronnych. W przypadku dostania się do oczu, przemywać wodą przez 15 minut i zgłosić się do lekarza. Chronić przed dziećmi! Preparat wyłącznie do użytku w akwariach! Nie stosować u ryb przeznaczonych do konsumpcji! Środek o silnym zapachu! W czasie użycia zapewnić dobrą wentylację.